Tehno Dent

Каталог продукции

Стоматологические материалы

2016

Tehno Dent

www.tehnodent.org

Содержание

Профилактические материалы

Полирен №1 4
Полирен №2 5
Флоу-Клинз 5
Флоу-Клинз-КОРУНД 5
Флоу-Клинз-ПРОФИ 6
Десенсетин суспензия 7
Фтор-Люкс лак 8
Фтор-Люкс комплект жидкостей 9

Материалы с гидроокисью кальция

Кальцетин порошок 10
Кальцетин паста 11
Купратин суспензия №1 11
Купратин суспензия №2 11

Пломбировочные материалы

Темподент 12
Аква-Цем 13
Полиакрилин стеклоиономерный цемент для реставрации 14
Полиакрилин кондиционер 16
Полиакрилин лак финишный 16
Полиакрилин стеклоиономерный цемент для фиксации 17

Эндодонтические материалы

Жидкость антисептическая хлоргексидина биглюконат (2%) 18
Гель антисептический 19
Жидкость антисептическая гипохлорит натрия (3%; 5,2%) 19
Жидкость для расширения и выявления устья каналов зубов 19
Гель для облегчения препарирования твердых тканей зуба 20
Гель для облегчения препарирования твердых тканей зуба с пероксидом 20
Крезотин жидкость №1 21
Крезотин жидкость №2 21
Крезотин – паста 22
Девитал 22
Эвгетин 23
Резортин 24
Иодотин паста для лечения 24
Иодотин паста 24
Кальцетин – эндодонтическое лечение 25
Купратин порошок 25
Рутдент 26
Эпоксидин 27

Вспомогательные материалы

Полирен №3 28
Травлин 29
Гель гемостатический 30
Десенсетин гель 31
Десенсетин спрей 31
Жидкость для высушивания и обезжиривания каналов и твердых тканей зубов 32
Жидкость гемостатическая для ретракции десны 32

Профилактические материалы

Полирен №1

Паста
Содержит кислотный компонент и абразив

140 руб. *(8 г)**
290 руб. *(45 г)*

Форма выпуска:
шприц (8 г), банка (45 г),
туба (50 мл)
арт. 014-01-008, 014-01-045,
014-01-050

РУ № ФСР 2012/13179
от 11.03.2012г.

Показания к применению

- Размягчение и удаление зубного камня без повреждения эмали

Эффект от применения

- Быстрое размягчение и удаление зубного камня
- Удобное нанесение
- Легко смывается водно-воздушной струей
- Приятный освежающий вкус

Фото 1. Исходное состояние до обработки.

Фото 2. После обработки пастой Полирен №1.

Аналоги по применению: «Detartrine» - «Septodont», Франция; «Klint» - «Voco», Германия.

Полирен №2

Паста
Содержит абразив (оксид кремния) фракции 30-50 мкм

Форма выпуска:
шприц (8 г), банка (45 г),
туба (50 мл)
арт. 014-02-008, 014-02-045,
014-02-050

РУ № ФСР 2012/13179
от 11.03.2012г.

130 руб. *(8 г)**
290 руб. *(45 г)*

Аналоги по применению: «Detartrine Z» -«Septodont», Франция.

Для применения в детской и взрослой стоматологии

Показания к применению

- Обработка эмали перед реставрацией или отбеливанием зубов, перед проведением герметизации фиссур
- Удаление мягкого налета
- Профилактика кариеса

Результат применения

- Эффективная профессиональная очистка эмали
- Качественное удаление мягкого налета и пелликул в труднодоступных местах и фиссурах
- Легко смывается водно-воздушной струей
- Приятный освежающий вкус

Флоу-Клинз

Суспензия
Содержит кальция фосфат (3-5 мкм)

Форма выпуска:
флакон стекло (100 мл)
арт. 011-03-100

РУ № ФСР 2012/13178
от 11.03.2012г.

240 руб.*

Аналоги по применению: «Vector Fluid Polish» – «Durr Dental», Германия.

Показания к применению

- Удаление зубного налета, поддесневого камня без повреждения твердых тканей с помощью ультразвукового воздействия

Клинический результат

- Эффективная очистка твердых тканей зуба
- Безболезненность процедуры обработки
- Хорошее проникновение в труднодоступные зоны
- Значительное снижение эндотоксинов без повреждения тканей
- Атравматичное проведение кюретажа

Флоу-Клинз-КОРУНД

Порошок №2
Содержит активный абразив – оксид алюминия (30-45 мкм)

Форма выпуска:
пластиковая банка (220 г)
арт. 011-02-220

РУ № ФСР 2012/13178
от 11.03.2012г.

430 руб.*

Показания к применению

- Препарирование кариозных полостей

Преимущества этого порошка

- Безболезненное препарирование и обработка кариозных полостей
- Качественная подготовка зуба к реставрации
- Высокая твердость абразива
- Подходит для всех аппаратов пескоструйного типа, предназначенных для препарирования твердых тканей зубов

Фото 1.
Вид культи зуба до обработки

Фото 2.
Вид культи зуба после обработки порошком «Флоу-Клинз КОРУНД»

Аналоги по применению: «AIR-FLOW Prep» - « EMS», Швейцария.

Флоу-Клинз-ПРОФИ

Порошок №1
Содержит карбонат кальция (50-70 мкм)

600 руб.*

Форма выпуска:
пластиковая банка
(220 г, 250 г)
арт. 011-01-220.2,
011-01-250.2

РУ № ФСР 2012/13178
от 11.03.2012 г.

Показания к применению

- Профилактическая очистка эмали зубов методом пескоструйной обработки

Эффективность

- Щадящее удаление налета, мягких зубных отложений, удаление пигментаций и отбеливание зубов
- Качественная очистка фиссур перед герметизацией
- Не приводит к гиперестезии зубов
- Не забивает наконечник во всех аппаратах пескоструйного типа

Нейтральный или со вкусом

Фото СЭМ. Кафедра стоматологии медицинского факультета БелГУ, 2013

Особый клинический интерес представляет способность «мягкого» абразива создавать зеркальную поверхность после обработки.



Рис. 1. Поверхность удаленного зуба до обработки.



Рис. 2. Поверхность удаленного зуба после обработки порошком «Флоу-Клинз-Профи».

Аналоги по применению: «AIR-FLOW» - « EMS», Швейцария.

Десенсетин

Суспензия
Содержит аргинин,
фосфат кальция, фторид натрия

Инновационная разработка!

200 руб.*

Форма выпуска:
шприц (5 мл)
арт. 010-03-005

РУ № ФСР 2012/13181
от 11.03.2012г.

Показания к применению

- Снижение гиперестезии твердых тканей зубов
- Профилактика кариеса

Почему стоит выбрать суспензию

- Мгновенное и надежное снижение чувствительности твердых тканей
- Герметизация и восстановление микродефекта эмали
- Глубокое проникновение препарата в дентинные канальцы
- Приятный освежающий аромат
- Универсальность в применении: аппликации, в каппах

Важная информация



Аргинин, обладая высокой буферной емкостью и способностью к выборочной ионизации, противодействует изменению pH: в присутствии кислот принимает на себя протоны и нейтрализует кислотность; при добавлении оснований высвобождает ионы водорода, препятствуя возрастанию pH. Попадая в дентинные канальца или микродефект, аргинин образует комплексное соединение, оседающее в микродефекте, закупоривающее и перекрывающее доступ раздражающих веществ. Фосфат кальция, входящий в состав препарата, является источником кальция и фосфора в соотношении, необходимом для укрепления твердых тканей.

Методы и объекты исследования:

3 группы людей по 25 человек
(20 мужчин и 55 женщин возрастом от 18 до 45 лет)
Информация любезно предоставлена СП №18 г. Санкт-Петербурга.

Результаты:

Применение суспензии, содержащей аргинин и фосфат кальция, приводит к быстрому снижению чувствительности с пролонгированным эффектом, особенно при способе пальцевого втирания в чувствительные участки зубов.

Результаты применения суспензии в зависимости от способа нанесения:

- пальцевое втирание непосредственно в участки с гиперчувствительностью
- обработка зубной щеткой
- обработка с помощью роторной насадки и циркулярной щетки

Показатели гиперчувствительности при воздействии струи воздуха



Аналоги по применению: «Sensitive Pro-Relief» - Colgate.

Фтор-Люкс

Лак фторирующий
Содержит фториды кальция и натрия, аминофторид

290 руб.*

Форма выпуска:
флакон (13 мл)
с крышкой капельницей
арт. 013-01-013

РУ № ФСР 2012/13176
от 11.03.2012г.

Для применения в детской и взрослой стоматологии

Показания к применению

- Гиперчувствительность пришеечной зоны зуба, препарированного под коронку «живого» зуба
- Чувствительность зубов после реставрации, препарирования, снятия зубных отложений, полировки эмали или отбеливания зубов
- Профилактика кариеса молочных зубов, зубов «мудрости»
- Защита фиссур в период их развития

Почему стоит выбрать лак

- Быстрое образование фторирующей пленки мгновенно снижает болевые ощущения у пациента
- Уникальное сочетание аминофторида и фторидов кальция и натрия ускоряет реминерализацию и укрепляет эмаль
- Высокая концентрация фторид-ионов с пролонгированным действием

Схема фторовыделения пленки лака



Фторид натрия восстанавливает химическое равновесие жидкости (слюны), предотвращая деминерализацию эмали.

Фторид кальция в кислой среде полости рта является пролонгированным и стабильным источником ионов кальция и фтора.

Аминофторид – органическое соединение с повышенной фторирующей активностью – обеспечивает мгновенное образование глобул фторида кальция на поверхности эмали, предотвращает потерю кальция и уменьшает проницаемость эмали.

Аналоги по применению: «Bifluorid 12» - «VOCO», Германия; «Фторлак» - «Омега-Дент», Россия.

Фтор-Люкс

Комплект жидкостей для глубокого фторирования эмали и дентина
Содержит фторсиликата магния и гидроокиси кальция

Форма выпуска:
флакон (10 мл) с крышкой капельницей,
флакон (10 мл) с крышкой пипеткой
арт. 013-02-010.010

РУ № ФСР 2012/13176
от 11.03.2012г.

700 руб.*

Показания к применению

- Обработка дентина глубоких полостей и защита пульпы перед пломбированием
- Профилактика первичного и вторичного кариеса, кариеса в стадии белого пятна
- Герметизация фиссур без препарирования эмали
- Обработка твердых тканей зубов при лечении пародонтита

Почему стоит выбрать комплект

- Образование фторида кальция непосредственно в дефекте (не счищается зубной щеткой) мгновенно освобождает пациента от гиперчувствительности
- Высокая концентрация ионов фтора обеспечивает долговременную реминерализацию
- Кремний инициирует реминерализацию и ускоряет усвоение кальция твердыми тканями
- Пролонгированная бактерицидность

Независимое исследование*



Группа 1:
одно нанесение в год

Группа 2:
2 нанесения в течение года

Группа 3:
Фтор-Люкс не применялся

возраст тестируемых 13 - 16 лет

Результат: двухразовое нанесение препарата Фтор-Люкс в течение года более эффективно снижает частоту развития кариеса.

*Данные любезно предоставлены МБОУ СОШ №19, г. Йошкар-Ола.

Аналоги по применению: «Дентин-герметизирующий ликвид», «Эмаль-герметизирующий ликвид» – «Humanchemie», Германия.

Материалы с гидроокисью кальция

Кальцетин

Гидроокись кальция в порошке

200 руб.*

Форма выпуска:
банка темное стекло (7 г),
арт. 004-02-007

РУ № ФСР 2011/10202
от 03.03.2011г.

Показания к применению
- Непрямое и прямое покрытие пульпы
- Пульпит (обратимые формы): травматический, острый серозный, хронический фиброзный
- Апексификация и апексогенез

Почему стоит выбрать порошок

- Высокое содержание гидроокиси кальция
- Антимикробный эффект (pH 12,8)
- Стимулирует регенерацию пульпы и образование вторичного дентина
- Совместим с любыми прокладочными и пломбировочными материалами
- При необходимости легко смешивается с водой для получения пасты необходимой консистенции

Кальцетин

Гидроокись кальция в пасте

Форма выпуска:
шприц (7 г),
пластиковые канюли
арт. 004-01-007

РУ № ФСР 2011/10202
от 03.03.2011г.

100 руб.*

Показания к применению

- Непрямое и прямое покрытие пульпы
- Пульпит (обратимые формы): травматический, острый серозный, хронический фиброзный
- Апексификация и апексогенез

Почему стоит выбрать пасту

- Готовая к применению форма выпуска
- Высокое содержание гидроокиси кальция
- Минимальный контакт с воздухом
- Удобное нанесение материала точечно на дно глубокой полости зуба

Аналоги по применению: «Calcimol» - «VOCO», Германия, «Calcipulpe» - «Septodont», Франция.

Купратин суспензия №1

На основе гидроокиси кальция

Запатентованный способ получения

Форма выпуска:
банка темное стекло (20 г)
арт. 006-01-020

РУ № ФСР 2011/10200
от 03.03.2011г.

450 руб.*

Показания к применению

- Промывание инфицированных корневых каналов
- В качестве тонкой прокладки вблизи пульпы для фронтальных зубов
- Прямое покрытие пульпы
- Апексификация
- Лечение молочных зубов

Почему стоит выбрать суспензию №1

- Чистая высокодисперсная гидроокись кальция
- Высокая щелочность (pH 12,8)
- Стимулирует образование дентина и костной ткани
- Оптимально подобранный состав, запатентованный способ получения

Аналоги по применению: «Гидроокись кальция высокодисперсная» - - «Humanchemie», Германия.

Купратин суспензия №2

На основе гидроокиси меди-кальция, гидроксокупрата

Ионы меди усиливают бактерицидность препарата в 100 раз

Форма выпуска:
банка темное стекло (20 г)
арт. 006-02-020

РУ № ФСР 2011/10200
от 03.03.2011г.

650 руб.*

Показания к применению

- Лечение корня с применением электро (депо) фореза или без применения электро (депо) фореза
- Лечение пародонтальных карманов
- Непрямое перекрытие пульпы

Почему стоит выбрать суспензию №2

- Метастабилизированная равновесная система
- Высокобактерицидная суспензия в отношении всех видов микроорганизмов
- Консистенцию препарата можно регулировать добавлением дистиллированной воды

Аналоги по применению: «Cupral» - «Humanchemie», Германия.

Пломбировочные материалы

Темподент

На основе окиси цинка, сульфата цинка | 2 формы выпуска

60 руб. *(50г)**
100 руб. *(80г)*
250 руб. *(200г)*

Форма выпуска:
паста - стеклянная банка (50 г) (х4)
порошок – пластиковая банка (80 г/200 г)
арт. 002-02-4.050,
002-01-080,
002-01-200

РУ № ФСР 2011/10204
от 03.03.2011г

Для применения в детской и взрослой стоматологии

Показания к применению

- Временное пломбирование при лечении кариеса

Преимущества

- Выпускается в двух формах – водозатворимый порошок и готовая к применению паста
- Высокая пластичность материала
- Не содержит эвгенола
- Быстрое отверждение (10 минут)
- Надежная герметизация полости зуба
- Без ограничений применяется в детской стоматологии

Отзыв стоматолога

Материал для временного закрытия полостей «Темподент» показал себя с хорошей стороны. Материал легко вносится в полость, не оставаясь ни на перчатках, ни на инструменте. Формирование временной пломбы из материала «Темподент» не вызывает трудностей, а быстрое время твердения и отсутствие вкуса и запаха делает его использование удобным не только для врача, но и для пациента. Благодаря исключительной прочности и хорошим адгезивным свойствам материала «Темподент» за полтора года его применения мною не было ни одного случая повторного обращения пациента до назначенного времени из-за выпадения или деформации временной пломбы. В то же время материал «Темподент» без сложностей извлекается из полости как с помощью ультразвукового скелера, так и стоматологическим зондом вручную.

Клиника «Перспективы», г. Белгород.

Аналоги по применению: «Cimpat» -«Septodont», Франция.

Аква-Цем
(белый, светло-желтый, золотисто-желтый)

На основе окиси цинка,
фосфатов алюминия и цинка,
ортофосфорной кислоты

Форма выпуска:
пластиковая банка (100 г),
флакон-капельница (60г),
мерная ложка, блокнот
арт. 009-01-100.060.1

РУ № ФСР 2012/13182
от 11.03.2012г.

200 руб.*

Для применения в детской и взрослой стоматологии

Показания к применению

- Фиксация одиночных коронок и мостовидных протезов, штифтов
- Пломбирование молочных зубов
- Пломбирование зубов, подлежащих закрытию коронками
- Изолирующая прокладка под пломбировочные материалы

Преимущества

- Содержит фторид кальция – противокариесный компонент
- Высокая прочность для фиксации (105 МПа) и для пломбирования (115 МПа)
- Простое замешивание и гомогенная консистенция
- Выпуск в трехцветовой гамме
- Оптимальное рабочее время (1,5-2 мин.) и время отверждения (6-8 мин.)

Важная информация



Показатель прочности цемента стоматологического «Аква-Цем» (ООО «ТехноДент») превышает аналогичный показатель по ГОСТ 31578 на 50%

Аналоги по применению: «Adhesor» - «Spofa-Dental», Чехия.

Полиакрилин стеклоиономерный цемент для реставрации

На основе тонкодисперсного кальций-алюмофторсиликатного стекла, полиакриловой кислоты, винной кислоты

Форма выпуска:
стеклянная банка (10 г)/
флакон-капельница (8 г)
арт. 021-02-008.010.A2,
021-02-008.010.A3

РУ № РЗН 2015/2855
от 15.07.2015г.

630 руб.*

Показания к применению

- Реставрация полостей I, II и V класса (по Блэку);
- Реставриция и пломбирования по ART-методике
- Пломбирования молочных зубов
- Герметизации фиссур, небольших дефектов
- Формирование слоя-основы под композитные реставрации
- Временное пломбирование

Преимущества

- Высокая адгезия к тканям зуба
- Оптимальное время твердения
- Прочность при сжатии 170±5МПа
- Пролонгированный противокариесный эффект
- Рентгеноконтрастность
- Биологическая совместимость
- Хорошие эстетические свойства
- Оттенки по шкале VITA:
  A1, A2, A3, A3,5
  B1, B2, B3
  C1, C2





Фториды способны выделяться из отвердевшего материала и вновь им поглощаться, причем, не оказывая никакого влияния на физические свойства пломбы.

Пролонгированное выделение ионов фтора способствует поддержанию процесса реминерализации и обеспечивает противокариесный эффект.

Graham J. Mount
«Атлас стеклоиономерных цементов», 2002 г.

Выдержка образца во фторсодержащем растворе (0,05% NaF) в течение 1 часа

* Внутреннее тестирование отдела исследований компании ТехноДент

Эстетические свойства Полиакрилин для реставрации

Прозрачность в сравнении

Оттенки по шкале VITA



Почему надо замешивать по инструкции?

Соотношение Порошок /жидкость (г/г)	Рабочее время (мин, сек)	Время твердения в камере 37°С влажность не менее 90%, мин*	Время твердения при комнатной температуре (22°С), мин	Прочность на сжатие, МПа	Примечание
Показатели ГОСТ 31578 и ISO 9917-2 (стеклоиономерные цементы для реставрации)	–	2-6	–	Не менее 130	
По инструкции 2,6:1	1,3-1,5	4,0-4,5	5,0-5,5	170-190	Оптимальные манипуляционные, физико-механические и эстетические характеристики, хорошая адгезия к твердым тканям и низкая растворимость
2,9:1 (очень густая смесь)	1	3,5-4,0	4,5-5,0	125-130	Отвержденный материал может обладать пористостью и пониженной адгезией, а также более низкими эстетическими свойствами
1,7:1 (очень текучая смесь)	3,0-3,5	7-8	10-11	100-110	Долго твердеет, отвержденный материал имеет повышенную растворимость и недостаточные физико-механические характеристики

*Время от момента окончания смешивания до момента исчезновения отпечатка следа иглы диаметром 1 мм под нагрузкой 400 г на поверхности цемента

**Испытания проводились на разрывной машине «Инстрон» со скоростью движения траверсы (0,75±0,30 мм/мин)

«GC» - «Fuji IX», Япония

Полиакрилин кондиционер

160 руб.*

Форма выпуска:
флакон (5мл)
арт. 021-03-005

РУ № РЗН 2015/2855
от 15.07.2015г.

Состав

Водный раствор полиакриловой кислоты (12%)

Преимущества применения

- Кондиционирование поверхности улучшает адгезию на 30% и ионный обмен между структурами зуба и стеклоиономерным цементом
- Высокая адгезия не ослабевает с течением времени, обусловлена химической связью полиакриловой кислоты с кальцием эмали и дентина
- Голубой цвет обеспечивает контроль нанесения
- Устраняет смазанный слой
- Оставляет дентинные канальца закрытыми, снижает риск возникновения чувствительности



Фото СЭМ отдельно взятого дентинного канальца после кондиционирования в течение 10 секунд 10 % раствором полиакриловой кислоты. Дентинный каналец почти полностью закрыт. Истечение дентинной жидкости и кислотного воздействия на пульпу – минимальны (Graham J.Mount «Атлас стеклоиономерных цементов», 2002г.).

Аналоги по применению: «GC» - «CAVITY CONDITIONER», «DENTIN CONDITIONER», Япония

Полиакрилин лак финишный

170 руб.*

Форма выпуска:
флакон (5 мл)
арт. 021-04-005

РУ № РЗН 2015/2855
от 15.07.2015г.

Состав

Пленкообразователь,
легколетучий растворитель.

Преимущества

- Защитная тонкая пленка изолирует пломбу на начальном этапе созревания от воздействия слюны.
- Нормализация водного баланса ионообменной реакции.
- Финишный лак придает реставрации эстетичный блеск

Аналоги по применению: «GC» - «Fuji Varnish», Япония

Полиакрилин стеклоиономерный цемент для фиксации

На основе тонкодисперсного кальций-алюмофторсиликатного стекла, полиакриловой кислоты, винной кислоты

Форма выпуска:

стеклянная банка (10 г)/ флакон-капельница (8 г),
стеклянная банка (20 г)/ флакон-капельница (16 г)

арт. 021-01-010.008,
021-01-020.016

РУ № РЗН 2015/2855
от 15.07.2015г.

600 руб. *(10 г/8 г)**
800 руб. *(20 г/16 г)*

Показания к применению

- Фиксация коронок, мостовидных протезов, а также вкладок и штифтов
- формирование культи зуба

Преимущества

- Пролонгированный противокариесный эффект
- Рентгеноконтрастность
- Биологическая совместимость
- Подходит для фиксации безметалловых коронок и мостов из высокопрочных типов керамики
- Толщина пленки 12 мкм
- Высокая адгезия

Сила адгезии = сила ионной связи



Схема взаимодействия полиакриловой кислоты с ионами кальция дентина

- Адгезия к дентину с применением кондиционера 6,5-7,5 МПа
- Адгезия к дентину без применения кондиционера 4,5-5,2 МПа

Аналоги по применению: «GC» - «Fuji I», Япония

Эндодонтические материалы

2% хлоргексидина биглюконат

Жидкость антисептическая

60 руб. *(15мл)**
140 руб. *(100мл)*

Форма выпуска:
флакон (15мл),
флакон (100мл)
арт. 001-31-015,
001-31-100

РУ № ФСР 2011/10206
от 18.03.2014г.

Показания к применению

- Обработка инфицированных корневых каналов зубов при лечении пульпитов и периодонтитов

Почему стоит выбрать жидкость

- Оптимальная концентрация антисептика для эффективной стерилизации корневых каналов
- Оригинальная система дозирования Luer Pro для использования препарата до последней капли
- Теперь не нужно заказывать в аптеке

Аналоги по применению: «Consepsis» - «Ultradent», США.

Гель антисептический

260 руб.* 2% хлоргексидина биглюконат

270 руб.* 2% хлоргексидина биглюконат, метронидазол

Форма выпуска:
шприц (5 мл),
пластиковые канюли
арт. 024-03-005,
024-04-005

РУ № РЗН 2015/2849
от 28.08.2015г.

Показания к применению

- Гангренозный пульпит, хроническая и острая формы периодонтита

Почему стоит выбрать гель

- Оптимальная консистенция для точного нанесения
- Удобное применение при помощи шприца с гибкими пластиковыми канюлями
- Активное подавление анаэробной флоры корневых каналов зубов

Гипохлорит натрия (3%; 5,2%)

Жидкость антисептическая

60 руб. *(30мл; 3%)**
180 руб. *(100мл; 3%)*
200 руб. *(100мл; 5,2%)*

Форма выпуска:
3% - флакон (30 мл),
флакон (100 мл)
5,2% - флакон (100 мл)
арт. 001-03-03.030,
001-03-03.100,
001-03-5.2.130

РУ № ФСР 2011/10206
от 18.03.2014г.

Показания к применению

- Обработка инфицированных корневых каналов зубов при лечении пульпитов и периодонтитов

Преимущества

- Мощная антисептика против инфекции
- Стабилизированная основа увеличивает срок использования
- Оригинальная система дозирования Luer Pro для использования препарата до последней капли

Аналоги по применению: «Parcan» - «Septodont», Франция.

Жидкость для расширения и выявления устья каналов зубов

На основе ЭДТА (20%)

150 руб. *(15мл)**
400 руб. *(100мл)*

Форма выпуска:
флакон (15 мл)
с крышкой пипеткой,
флакон (100 мл)
арт. 001-02-015,
001-02-100

РУ № ФСР 2011/10206
от 18.03.2014г.

Показания к применению

- Выявление устья корневых каналов
- Химическое расширение каналов при подготовке к пломбированию

Почему стоит выбрать жидкость

- Содержит поверхностно-активный антисептик, обеспечивающий пенообразование
- Низкий коэффициент поверхностного натяжения – быстрое проникновение препарата в каналы и микроканальцы
- Простота применения с удобной пипеткой

Аналоги по применению: «Canal-plus» - « Septodont », Франция.

Гель для облегчения препарирования твердых тканей зуба

Содержит ЭДТА (20%)

Форма выпуска:
шприц (5 мл),
пластиковые канюли
арт. 024-01-005

РУ № РЗН 2015/2849
от 28.08.2015г.

150 руб.*

Показания к применению

- Выявление и формирование устья корневых каналов
- Смазка инструментов при химико-механическом расширении каналов

Почему стоит выбрать гель

- Хороший лубрикант для эндодонтических инструментов
- Быстрое проникновение препарата в каналы и микроканальцы
- Легко вымывается водой

Аналоги по применению: «File–Eze» - «Ultradent», США.

Гель для облегчения препарирования твердых тканей зуба

Содержит ЭДТУ (17%) и пероксид (10%)

Форма выпуска:
шприц (5 мл),
пластиковые канюли
арт. 024-02-005

РУ № РЗН 2015/2849
от 28.08.2015г.

250 руб.*

Показания к применению
- Выявление устья корневых каналов
- Смазка инструментов при химикомеханическом расширении каналов

Почему стоит выбрать гель с пероксидом
- Отличная индикация чистоты промывания канала
- Быстрое проникновение препарата в каналы и микроканальцы
- В сочетании с гипохлоритом натрия - повышенное пенообразование с активным выделением хлора и атомарного кислорода
- Улучшение цвета и блеска зубов путем внутриканального отбеливания
- Легко вымывается водой

Фото СЭМ. Кафедра терапевтической стоматологии. Омская Государственная Медицинская Академия, 2013



Рис. 1. Вид дентина корневого канала после инструментальной обработки без применения лубрикантов (удаленный зуб).



Рис. 2. Вид дентина корневого канала после инструментальной обработки с применением геля ЭДТУ с пероксидом (удаленный зуб).

Аналоги по применению: «RC-Prep» - «Premier», США.

Крезотин жидкость №1

На основе камфоры, хлорфенола
и лидокаина гидрохлорида

Форма выпуска:
флакон (15 мл)
с крышкой пипеткой
арт. 015-01-015

РУ № ФСР 2012/13180
от 11.03.2012г.

200 руб.*

Показания к применению

- Обезболивание и антисептика при травматических и острых пульпитах перед девитализацией пульпы
- Обезболивание при периодонтитах

Почему стоит выбрать жидкость №1

- Мгновенный и надежный болеутоляющий эффект
- Мощное антисептическое средство
- Не вызывает раздражения
- Высокая проникающая способность
- Удобная пипетка

Аналоги по применению: «Pulperyl» - «Septodont», Франция.

Крезотин жидкость №2

На основе фенола,
эвгенола, формальдегида

Форма выпуска:
флакон (15 мл)
с крышкой пипеткой
арт. 015-02-015

РУ № ФСР 2012/13180
от 11.03.2012г.

210 руб.*

Показания к применению

- Инфицированные каналы зубов при осложненном пульпите
- Антисептическая обработка при резекции верхней части корня зуба
- Обработка инфицированных корневых каналов при периодонтитах

Почему стоит выбрать жидкость №2

- Мощное антисептическое воздействие
- Полная стерилизация корневых каналов зубов
- Эффективное снижение болевых реакций, противовоспалительное и антиаллергическое действие
- Удобная пипетка

Опыт клинического применения антисептической жидкости «Крезотин» №2 и материала стоматологического «Эвгетин» для пломбирования корневых каналов

Пациент К., 37 лет, обратился с жалобами на изменение 42 зуба в цвете.
Объективно: 42 на дистально-контактной поверхности отмечается глубокая кариозная полость заполненная деминерализованным дентином, зондирование дна и стенок полости безболезненно, перкуссия отрицательна. На прицельной внутриротовой рентгенограмме 42 зуба зуб ранее не лечен, корневой канал на рентгеноконтрастен. Отмечается заапикальная резорбция костной ткани с неровными, нечёткими границами.


(февраль 2013)

Проведённое лечение: 42 раскрыта полость зуба, механическая и медикаментозная обработка канала с использованием жидкости антисептической для обработки корневых каналов (жидкость №2 «Крезотин»). Канал 42 зуба запломбирован пастой «Эвгетин» с незначительным выведением пломбировочного материала в заапикальный очаг деструкции.


(февраль 2013)

Контрольная рентгенограмма через 7 месяцев после проведённого лечения:
Результаты удовлетворительные. Пациент жалоб не имеет.


(сентябрь 2013)

**Кафедра терапевтической стоматологии. Омская Государственная Медицинская Академия, 2013.*

Аналоги по применению: «Rockle's» - «Septodont», Франция.

Крезотин – паста

На основе окиси и сульфата
цинка с добавлением антисептика

250 руб.*

Форма выпуска:
банка темное стекло (25 г)
арт. 015-03-025

РУ № ФСР 2012/13180
от 11.03.2012г.

Показания к применению

- Пломбирование инфицированных и труднопроходимых каналов
- Пломбирование каналов с неполной экстирпацией пульпы

Преимущества

- Превосходная текучесть (23 мм)
- Низкая растворимость материала (1,5%)
- Высокие антисептические и вяжущие свойства
- Высокая рентгеноконтрастность
- Эффективное снижение болевых реакций – содержит дексаметазон (0,01%)
- Легко вводится с помощью каналонаполнителя

Аналоги по применению: «Cresopate» - «Septodont», Франция.

Девитал

Паста без мышьяка
Содержит параформ (30%),
лидокаина гидрохлорид

Для применения в детской и взрослой стоматологии

200 руб. *(5г)**
300 руб. *(13г)*

Форма выпуска:
банка пластиковая (5 г)/
банка темное стекло (13 г)
арт. 016-02-005, 016-02-013

РУ № ФСР 2012/13177
от 11.03.2012г.

Показания к применению

- Девитализация пульпы перед удалением или ампутацией

Преимущества

- Надежная девитализация пульпы
- Пролонгированное действие
- Безболезненность процедуры
- Эффективный некроз пульпы без мышьяка
- Применим для взрослой и детской стоматологии

Аналоги по применению: «Caustinerf forte» - «Septodont», Франция; «Depulpin» - «Voco», Германия.

Эвгетин

На основе окиси цинка, кальцийфосфата, эвгенола, дийодтимола

Форма выпуска:
банка пластиковая (14 г),
флакон с крышкой пипеткой (10 мл),
мерная ложка, блокнот
арт. 005-01-014.010

РУ № ФСР 2011/10203
от 03.03.2011г.

700 руб.*

Показания к применению

- Пломбирование подготовленных корневых каналов с использованием гуттаперчевых штифтов
- Пломбирование корневых каналов в особых клинических случаях без использования гуттаперчевых штифтов

Преимущества

- Значительное снижение периапикальной чувствительности (содержит дексаметазон - 0,01%, гидрокортизона ацетат - 1,00%)
- Легко смешивается и остается пластичным в течение 2-3 часов
- Мощное бактерицидное действие за счет содержания дийодтимола
- Плотное заполнение каналов и микроканальцев (толщина пленки 3-5мкм)
- Низкая растворимость (0,5%) гарантирует продолжительную службу корневой пломбы
- Рентгеноконтрастный

Эвгенол







Эвгенолят цинка

Клинический опыт* применения материала «Эвгетин» при обтурации корневого канала совместо с гуттаперчей

Пациентка Ю., 30 лет обратилась с жалобами на периодически возникающие ноющие боли и боли при накусывании в области 11 зуба. Было проведено повторное лечение корневого канала 11 зуба с последующей его абтурацией с ипользованием пасты «Эвгетин» и конусной гуттаперчи и закрытие перфорации корня материалом «Рутдент быстротвердеющий».

**Благодарим доктора И.Фермана за предоставленный материал.*



Аналоги по применению: «Endomethazone» - «Septodont», Франция.

Резортин

На основе резорцина,
формальдегида и окиси цинка,
с отбеливающим компонентом

Форма выпуска:
стеклянная банка (10 г),
флакон с крышкой
пипеткой (5 мл),
флакон с крышкой
капельницей (5 мл),
мерная ложка, блокнот
арт. 007-010.005.005

РУ № ФСР 2011/10199
от 03.03.2011г.

300 руб.*

Показания к применению

- Лечение узких труднопроходимых инфицированных каналов зубов
- Антисептическая обработка и пломбирование корневых каналов с неполной экстирпацией пульпы

Клинический результат

- Эффективная антисептическая обработка дентинных канальцев цемента корня
- Надежное пломбирование корневых каналов
- Оптимальный состав для плотного заполнения каналов
- Сохраняет цвет зуба благодаря уникальным компонентам

Аналоги по применению: «Forfenan» - «Septodont», Франция; «Foredent» - «Spofa Dental», Чехия.

Иодотин паста для лечения (временного заполнения корневых каналов зубов)

На основе иодоформа и гидроокиси кальция

Для применения в детской и взрослой стоматологии

Форма выпуска:
шприц (2 г),
пластиковые канюли
арт. 003-02-002

РУ № ФСР 2011/1020
от 03.03.2011г.

280 руб.*

Показания к применению

- Хронические и все деструктивные формы периодонтитов
- Апексификация корня при периодонтитах
- Инфицирование в области перфораций и переломов корней
- Пломбирование каналов молочных зубов

Почему стоит выбрать пасту в шприце

- Усиленные антисептические свойства – содержит йодоформ
- Превосходный антибактериальный эффект (pH 12,8) и рентгеноконтрастность
- При необходимости пасту можно оставлять в апикальной и заапикальной части канала при постоянном пломбировании
- Стимулирует образование твердой ткани на уровне апекса
- Шприц с усиленным поршнем, удобным захватом и системой Luer-Lock
- Ультратонкие канюли (0,52 мм с калибром отверстия 22)

Аналоги по применению: «Metapex»-«Meta Biomed», Ю. Корея.

Иодотин паста

На основе иодоформа, хлорфенола, камфоры

Форма выпуска:
банка темное стекло (25 г)
арт. 003-01-025, 003-02-025

РУ № ФСР 2011/10201
от 03.03.2011г.

[1] 160 руб.*

[2] 165 руб.*

Показания к применению

- Лечение пульпитов
- Лечение гранулематозного и гранулирующего периодонтита со свищом

Почему стоит выбрать пасту в банке

Иодотин нетвердеющая паста (для временного заполнения)[1]
- Мощное пролонгированное бактерицидное действие
- Высокая рентгеноконтрастность материала
- Простой способ применения в сочетании с высокой эффективностью

Иодотин твердеющая паста (для постоянного пломбирования)[2]
- Плотное заполнение корневых каналов
- Идеально подходит для пломбирования с гуттаперчей
- Высокая рентгеноконтрастность материала

Аналоги по применению: «Tempophore» - «Septodont», Франция.

Кальцетин – эндодонтическое лечение
(временное заполнение корневых каналов)

Паста на основе гидроокиси кальция

Форма выпуска:
шприц (2 г),
пластиковые канюли
арт. 004-03-002

РУ № ФСР 2011/10202
от 03.03.2011г.

270 руб.*

Для применения в детской и взрослой стоматологии

Показания к применению

- Необратимые формы пульпита
- Консервативное лечение всех форм хронических периодонтитов
- Апексификация и апексогенез

Преимущества

- Превосходный антибактериальный эффект (pH 12,8) и рентгеноконтрастность
- Создание условий для роста и формирования корня зуба
- При необходимости паста легко извлекается из каналов
- Шприц с усиленным поршнем, удобным захватом и системой Luer-Lock
- Ультратонкие канюли (0,52 мм с калибром отверстия 22) позволят ввести пасту непосредственно в канал

Аналоги по применению: «Metapaste» - «Meta Biomed», Ю. Корея.

Купратин порошок

На основе алюмокальциевых силикатов и гидроокиси кальция

Форма выпуска:
банка темное стекло (10 г), мерная ложка, блокнот
арт. 006-03-010

РУ № ФСР 2011/10200
от 03.03.2011г.

550 руб.*

Для применения в детской и взрослой стоматологии

Показания к применению

- Для окончательного пломбирования каналов после любого вида лечения корня

Основные свойства

- Длительнотвердеющий цемент с pH 12,8
- Долговременное дезинфицирующее действие
- Остеопластические свойства и эффективная регенерация твердых тканей
- Высокая пластичность при замешивании
- Плотное заполнение корневых каналов
- Низкая растворимость (0,5%)

Аналоги по применению: «Атацамит» - «Humanchemie», Германия.

Рутдент

На основе оксида кальция, кремния, алюминия

Форма выпуска:
10 пакетов по 0,5 г,
блокнот, флакон-капельница
арт. 008-01-005, 008-02-005

РУ № ФСР 2011/10205
от 03.03.2011г.

Для применения в детской и взрослой стоматологии

Преимущества

- Твердеет в присутствии влаги, крови
- Контролируемое время отверждения
- Высокая механическая прочность
- Превосходная биосовместимость
- Низкая растворимость
- Высокая щелочность и микробоцидность

1200 руб. *(Рутдент)**
1400 руб. *(Рутдент быстр.)*

Характеристики / Виды	Рутдент	Рутдент быстротвердеющий
Время первоначального твердения	4 часа	10-12 минут
Прочность при сжатии, МПа	40±2	45±2
Растворимость, %	0,70	0,58
Значение pH	12,8	12,8

Герметичность:



Область клинического применения материала Рутдент



Опыт клинического применения материала Рутдент при проведении резекции верхушки корня и ретроградного пломбирования

Рис.1.

Рис.2.


Рис.3.

Рис.4.

Рис.1. Пациентка С., 19 лет: радикулярная киста верхней челюсти в области зубов 21, 22
Рис.2 Операция резекции верхушки корня зубов 21, 22: удаление оболочки кисты
Рис.3. Ретроградное пломбирование каналов зубов 21 и 22 материалом «Рутдент»
Рис.4. Пациентка С., 19 лет: через 1,5 месяца после операции: отмечаются признаки регенерации костной ткани и уменьшение размеров дефекта, апикальные пломбы сохранены, определяются на рентгенограмме

Клинический журнал стоматологов-профессионалов «Маэстро стоматологии» №45, стр 66-69, Медико-экономическое обоснование выбора материалов для ретроградного пломбирования корневых каналов при операции резекции верхушки корня зуба в условиях бюджетных лечебно - профилактических учреждений, Кузьмина Е.В., Щербакова Т.Е., Иванова К.А.

Аналоги по применению: «ProRoot, MTA» - «Dentsply» США; «Biodentine» - «Septodont», Франция.

Эпоксидин

На основе эпоксидно-аминного полимера

Форма выпуска:
паста желтая (туба, 4 мл),
паста белая (туба, 4 мл)
арт. 017-01-004.004

РУ № ФСР 2012/13175
11.03.2012г.

800 руб.*

Показания к применению

- Пломбирование коревых каналов зубов с применением гуттаперчивых, серебряных и титановых штифтов, а также горячей гуттаперчи

Преимущества и основные показатели

- Превосходная текучесть
- Долговечность
- Надежная герметичность
- Не содержит уротропин

Толщина пленки - 5 мкм;
Оптимальная текучесть - 25 мм

позволяют материалу проникать и заполнять промежутки между штифтами и стенками корневого канала, обеспечивая плотное прилегание штифтов и монолитность корневой пломбы

\+

Низкая растворимость - 0,1%

в 30 раз меньше показателя по ГОСТ 31071 (ISO 6876) (п. 4.8)



Эпоксидин не содержит в своем составе уротропин. При отверждении герметика отсутствуют токсичные пары и экзотермические эффекты в корневой пломбе, благодаря чему объем материала остается стабильным, что полностью исключает постпломбировочные боли у пациента.

• Идеальная герметичность
• Долговечный результат

**Данные любезно предоставлены кафедрой терапевтической стоматологии Омской Государственной Медицинской Академии, 2014 г.*

Клинический случай*

Пациентка Ш. 38 лет.

Диагноз: хронический периодонтит зуба 45. В процессе лечения в зубе 45 выявлены 2 корневых канала. На этапе обтурации использована термопластифицированная гуттаперча с материалом Эпоксидин.

Фото 1. Зуб 45 до лечения.

Фото 2. Зуб 45 сразу после лечения.



Фото 3. Зуб 45 через 6 месяцев после лечения

**Благодарим за предоставленный материал Леош А.Е. и Ильина М.В. (ООО «Стоматология ЛЕОШ» г. Сыктывкар).*

Аналоги по применению: «AH Plus» - «Dentsply», США.



Вспомогательные материалы

Полирен №3

Паста
Содержит абразив (корунд)
фракции 3-5 мкм

140 руб. *(8 г)**
290 руб. *(45 г)*

Форма выпуска:
шприц (8 г),
банка (45 г),
туба (50 мл)
арт. 014-03-008, 014-03-045,
014-03-050

РУ № ФСР 2012/13179
от 11.03.2012г.

Показания к применению

- Полирование пломб из композитных и стеклоиономерных материалов

Преимущества

- Качественная обработка пломб
- Удобное нанесение
- Отличная смываемость водой
- Эффект «сухого» блеска

Аналоги по применению: «Super Polish» - «Kerr», США.

Травлин

Содержит ортофосфорную кислоту (37%), хлорбутанол (активный антисептик)

190 руб.*

Форма выпуска:
шприц (5 мл),
пластиковые канюли
арт. 012-01-005

РУ № ФСР 2012/13174
от 11.03.2012г.

Показания к применению

- Травление эмали и дентина, применяемое в технологии кислотного травления

Преимущества

- Высокая контрастность цвета для контроля нанесения
- Оптимальная консистенция для точечного нанесения
- Быстрое удаление смазанного слоя
- Легко и полностью смывается водно-воздушной струей
- Простота в применении

Решающим фактором при травлении твердых тканей зуба ортофосфорной кислотой является консистенция геля.

Нанесли на вертикальную поверхность

Анализ данных изображений показывает, что гель «Травлин» имеет оптимальную консистенцию, которая обеспечивает точечное нанесение и воздействие препарата на запланированную для травления поверхность без смещений и подтеканий с этой поверхности во время выдержки.

Практическое применение*

Фото 1. Исходная ситуация.

Фото 2. Проведено протравливание препарированной поверхности гелем «Травлин»

Фото 3. Поверхность стала матовой

Фото 4. Конечный результат реставрации

Благодарим за предоставленный материал Леош А.Е., Ильина М.В. (ООО «Стоматология ЛЕОШ» г. Сыктывкар) и Пархачеву М.Н. (ООО «Дент-Мастер» г. Сыктывкар).

Аналоги по применению: «Vococid» - «Voco», Германия.

Гель гемостатический

На основе хлорида алюминия

Форма выпуска:
шприц (5 мл),
пластиковые канюли
арт. 001-41-005

РУ № ФСР 2011/10206
от 18.03.2014г.

200 руб.*

Преимущества

- Каппилярное кровотечение из десны
- Десневое просачивание
- Ретракция десны при снятии слепков и лечении пришеечного кариеса
- Обработка корневых каналов зубов при апикальном кровотечении

Почему стоит выбрать гель

- Высокоэффективное гемостатическое и вяжущее средство
- Мгновенная ретракция с длительным эффектом (20-30 мин.)
- Легко смывается струей воды
- Не вызывает окрашивания контактирующих тканей и материалов
- Удобное применение при помощи шприца с гибкими пластиковыми канюлями



Коагулограмма показывает, что при введении геля гемостатического ООО «ТехноДент» в пробу крови, сгусток образуется в течении 15 секунд, что в 4 раза быстрее в сравнении с аналогичными конкурентными продуктами.

Аналоги по применению: «ViscoStat Clear» - «Ultradent», США.

Десенсетин гель

Содержит лидокаина гидрохлорид (15%)

Для применения в детской и взрослой стоматологии

Мгновенный и длительный эффект!

Форма выпуска:
банка 30 мл (35 гр),
арт. 010-01-030.1

РУ № ФСР 2012/13181
от 11.03.2012г.

300 руб.*

Обезболивание

- Слизистой перед инъекцией
- Мягких тканей при удалении поддесневых зубных отложений
- Тканей при малоинвазивных хирургических вмешательств в полости рта
- При удалении молочных зубов, при прорезывании зубов и устранение рвотного рефлекса
- При лечении стоматитов и эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки полости рта

Воздействие препарата на пациентов различных возрастных групп:



Почему стоит выбрать гель

- Сверхбыстрый эффект (10-15 сек.) воздействия на рецепторы участка нанесения
- Легко аппликируется на слизистую поверхность
- Обеспечивает безболезненность процедуры в течении 20 мин.
- 4 приятных вкуса (лесная ягода, тропик, цитрус, мята) + нейтральный

Для исследования взята доза в количестве 0,05 г препарата (ориентировочно размером пшеничного зерна)*.
При нанесении дозы материалом покрывается площадь 4 см^2
**для детей доза уменьшена в 3 раза.*

Независимые исследования доктора И. Фермана

Десенсетин спрей

Содержит лидокаина гидрохлорид (10%)

Форма выпуска:
флакон-спрей (15 мл)
арт. 010-02-015

РУ № ФСР 2012/13181
от 11.03.2012г.

140 руб.*

Показания к применению

- Обезболивание места вкола
- Обезболивание при малоинвазивных вмешательствах в полости рта
- Устранение рвотного рефлекса
- Применим в детской стоматологии

Почему стоит выбрать спрей

- Удобная насадка
- Экономия времени: трехэтапная анестезия проводится в 2 этапа

Важная информация

- Одним нажатием помпы выпрыскивается 0,12-0,15 мл
- Поверхностная анестезия наступает за 10 секунд
- На расстоянии 1см от поверхности при одном нажатии помпы обрабатывается участок (25х25) мм^2, при обработке вблизи поверхности - (10х10) мм^2



1 этап. Аппликация анестезирующего спрея Десенсетин на место будущего вкола иглы

3 = 2



3 этап. Поднадкостничное введение раствора анестетика.

Аналоги по применению: «Xylonor gel» - «Septodont», Франция; «Лидоксор» - «Омега-Дент», Россия.

Жидкость для высушивания и обезжиривания каналов и твердых тканей зубов

На основе изопропанола,
изоамилацетата

Форма выпуска:
флакон (15 мл, 30 мл)
арт. 001-01-015, 001-01-030

РУ № ФСР 2011/10206
от 18.03.2014г.

Показания к применению

- Удаление влаги и обезжиривание корневых каналов и кариозных полостей
- Обработка зубов, препарированных под коронку, перед фиксацией протеза

Преимущества

- Быстрое и эффективное обезвоживание поверхности
- Полное обезжиривание твердых тканей
- Не содержит диэтилового эфира
- Экономична в использовании

190 руб. *(15 мл)**
250 руб. *(30 мл)*

Аналоги по применению: «Hidrol» - «Septodont», Франция.

Жидкость гемостатическая для ретракции десны

На основе хлорида
алюминия

Форма выпуска:
флакон (15 мл)
с крышкой пипеткой
арт. 001-04-015

РУ № ФСР 2011/10206
от 18.03.2014г.

Показания к применению

- Апикальное кровотечение
- Десневое просачивание
- Для ретракции десны

Почему стоит выбрать жидкость

- Мгновенный гемостаз
- Эффективная и длительная ретракция
- Не окрашивает контактирующие ткани и материалы
- Обладает антисептическими свойствами (содержит цетримид)

190 руб.*



– образование сгустка крови в гемостатической жидкости в течение 10 секунд (исследование лаборатории разработок ООО «ТехноДент»)

Аналоги по применению: «Racestyptine» - «Septodont», Франция.

Наша продукция –
в Вашем регионе

и в других странах мира

- Армения
- Беларусь
- Греция
- Израиль
- Ирак
- Казахстан
- Киргизия
- Тунис
- Узбекистан
- Украина

Партнеры:

Город	Компания	Телефоны
Азов	А-стомм	(86342) 4-46-43
Анапа	Медтехника	(86133) 3-15-10, 3-04-60
Ангарск	СВ-Дентал	(3955) 527-309
Армавир	ИП Копцева М.А.	(86137) 5-89-20, 5-08-55
	Алекон-Дент	(86137) 3-99-02
Архангельск	Зубная формула	(8182) 20-73-40, 43-14-73
	Инмед	(818) 263-31-52
	Юника-Дент	(8182) 65-61-26, 28-60-56
Астрахань	маг. "Дмитрий"	(8512) 35-88-44
	Кутум	(8512) 52-54-10, 52-54-08
Барнаул	Алтаймедтехника, АКГУП	(3852) 36-40-16, 66-70-53
	Восточный Альянс	(3852) 22-39-70, 22-39-60
	Сидент/Сибфарм	(3852) 61-13-73, 61-13-74
	Айси-дент	(3852) 52-09-20, 43-77-44
Белгород	Альфамед	(4722) 20-50-65
	Медика-Сервис	(4722) 33-38-53
Бийск	Трио-Дент	(3854) 412-768, 41-24-44
Благовещенск	ИП Жушман И.В.	(4162) 38-11-40
Братск	Братская Медицинская Компания	(3953) 46-47-71, 46-53-71
	Новамед	(3953) 286-003
Брянск	ИП Сербинович А.	(4833) 64-52-93
Великий Новгород	НовДентаСтома	(8162) 78-64-35
	Дентокс	(8162) 600-620
Владивосток	Дентал-Экспресс	(4232) 44-73-78, 44-07-03
	Денталь-Плюс	(4232) 41-85-10, 43-52-27
Владикавказ	Интерком	(8672) 280-721, 280-662
	РегулДент	(8672) 700-182, 700-183
	Альба	(8672) 53-64-90
Владимир	Интермед	(4922) 43-03-18
	Хиратрейд СП	(4922) 42-05-32
	ИП Бурдонов Н.В.	(4922) 43-00-22
Волгоград	Дентал Евромед	(8442) 23-88-99
Вологда	Зубная формула	(8172) 732-580, 700-540
	Медлайн	(8172) 723-819, 751-902
	Хелс	(8172) 522-313, 538-140
Воронеж	Альфамед	(4732) 24-65-55
	Медика-Сервис	(4732) 53-24-66, 53-28-81
Грозный	Медтехника	8-928-244-44-20
	Флекс	8-928-00-34-888
Екатеринбург	ПКФ ФармРесурс	(343)288-78-58
	Мегадента	(343) 388-09-09, 388-24-32
	Мастер Дент	(343) 287-50-50, 200-90-55
	Стоматорг-Е	(343) 381-55-11, 381-54-54
	Техно-Дент	(343) 212-45-20, 212-84-42
	Иннова Дент	(343) 290-6000
Иваново	Академия Бизнеса	(4932) 42-07-58, 32-85-52
Ижевск	Дентторг	(3412) 72-55-75, 72-30-16
	Эстетика	(3412) 73-54-73, 8-912-752-3349
	Ризадент	(3412) 400-056, 720-110
Избербаш	Смайл	8-988-798-81-81
Иркутск	Дента-Люкс Трейд	(3952)-200-691, 24-00-15
	Med-Веди	(3952) 20-87-64, 20-95-63
	КлубНИКА Дентал Групп	(3952) 66-07-88
Йошкар-Ола	Евромед (Камед-М)	(8362) 410-560
	Витадент	(836) 272-91-90
Казань	Рокада Мед	(843) 570-68-80, 570-68-81
	Медиана-Форт	(843) 2777-888, 2777-117
	МедСпортКомплект	(843) 527-53-36, 527-53-39
	МедиоМед (Кристалл)	(843) 272-70-73
	Дион Медсервис	(843) 279-72-68, 279-81-27
	Торговый дом КМИЗ	(843) 203-94-98
Калининград	Медицина	(4012) 46-69-46, 46-75-83
	АОЗТ Центродент	(4012) 91-80-23
	Тетрабалт	(4012) 45-19-13, 53-83-03
	НафтаБалт	(4012) 92-14-62
	Русгермед	(4012) 67-20-83
Калуга	ИП Яковенко И.Г.	(4842) 227-127, 226-127
	Ньюдент	(4842) 53-47-76

Партнеры:

Город	Компания	Телефоны
Кемерово	Стомлюкс	(3842) 75-63-50
	Альстом	(3842) 31-20-20
Киров	Авента (Вятка-мед)	(8332) 498-431
	Реал-Дент	(8332) 35-42-42, 8-912-827-4308
	Эталон	(8332) 37-70-21, 37-70-22
	ВелесМед	(8332) 34-11-10
Комсомольск-на-Амуре	Стома-Маркет	(4217) 53-02-92
Кострома	Костромская Медтехника	(4942) 45-33-45
Краснодар	СВВ	(861) 239-01-71, 239-33-34
	Казанские инструменты	(861) 268-57-45, 268-69-73
	ВистаДент	8-918-022-62-50
	Вудстом	8-988-244-24-22
	Диа-дент Юг	(861) 255-06-14
	ИП Черненко А.Б	(861) 252-28-95
	МедикЛюкс МедФармРазвитие	8-988-183-1831, 8-938-484-5554
Красноярск	Аквила	(391) 272-75-02, 272-06-15
	Альтернатива-М	(391) 273-61-75
	Стомэкс	(391) 262-38-96
Крымск	Вест	(86131) 2-25-66
	Дентал Сити	8-918-999-80-28
Курган	ИП Узун Татьяна Николаевна	(3522) 248-311
Курск	Альфамед	(4712) 27-02-77
	Медика-Сервис	(4712) 70-04-07
	Все для стоматолога	(4712) 54-60-40
Липецк	Альфамед	(4742) 22-14-34, 246-555
	Медика-Сервис	(4742) 35-73-70
	Мир Стоматологии	(4742) 28-11-44
Магнитогорск	Анжелика	(3519) 40-37-40
	Товары для здоровья	(3519) 22-43-99
Махачкала	Мед-торг	8-988-780-72-72, 8-927-164-57-57
	ИП Хартумова Р.М.	(8722) 67-86-82
	Дентал Плюс	8-989-651-21-21
	Дантист	8-928-048-55-75
	Дента Сервис	8-928-676-65-61
	ИП Абакаров А.И.	8-928-670-30-32, 8-967-401-30-32
	Лекарь	8-926-996-08-25
Москва	Эль-Дент	(495) 789-67-39
	ФармГеоком	(495) 411-53-43, 411-53-44
	Мегаполис	(495) 988-38-87, 789-89-12
	Макс Фарма	(495) 625-26-59, 628-22-88
	Фармапост	(495) 223-23-42, (499) 704-13-25
	ТД Лето	(495)504-36-81
	Руденко Л.В., ИП	(499) 129-01-83, (499) 124-48-09
	Полимедсервис	(495) 979-86-49, 724-09-28
	Виста (Allfordent)	(495) 740-78-85, (499) 173-77-37
	РРК Интернешнел	(495) 792-42-67
	Алекс Форте	(495) 930-61-31, 649-57-27
	Дентал Клаб	(495) 225-45-66
	Сварог	8-916-254-68-39
	ДДС	(495) 663-15-16, (499) 753-41-15
	Антика	(495) 438-81-01
	ЛеоСтом	(495) 727-14-30, 8 800 100 59 90
	Медицинский портал	(495) 971-39-46
	32+	(499)322-30-81, 8-903-322-30-81
	СловМедПром	(499) 343 52 56, 8-977-337-37-62
	Лас Дентос	(495) 640-97-07
Московская область		
Королев	Альдера	8-800-555-33-32, (495) 516-0532
Ногинск	М-Порт	(495) 724-52-10, 8926-877-2303
	Магия улыбки	8926-262-1402, 8916-512-1850
Щелково	ЛогистикМед	8925-475-7872, 8915-257-0146
Мурманск	Астрадент	(8152) 410-516
Назрань	Парадиз-М	(8732) 222-061

Партнеры:

Город	Компания	Телефоны
Нальчик	Магеллан -Бост	(8662) 42-37-41, 72-31-18
	Смайл	8-903-490-95-73, 8-928-077-00-14
Набережные Челны	Рокада Мед	(8552) 38-46-55, 38-47-88
Нижневартовск	Юни-Фарм	(3466) 27-02-10
Нижний Новгород	Рокада Мед	(831) 416-79-66, 416-79-65
	Аптечная служба	(831) 422-56-15, 422-54-79
	Фармрос	(831) 4-129-147, 4-129-137
	ФармаСтом	(831) 439-32-71, 430-63-47
Новороссийск	Империя Дент	(8617) 30-30-93
	Эхо	(8617) 61-80-84
Новосибирск	Шаклин	(383) 336-01-23, 335-61-23
	Инверсия (филиал)	(383) 278-53-35, 399-02-02
	Блеск-Тех	(383) 315-28-60, 315-27-80
	Дентал-Сити	(383) 380-08-10, 380-08-11
	АюрДент	(383) 266-94-22, 266-95-68
Октябрьский	Анжелика (филиал)	(34767) 39-639
Омск	РА-Мед	(381) 225-09-10, 223-05-27
	Ом Дент	(3812) 25-57-39, 94-80-55
	Альфа-Медика	(3812) 34-77-99, 50-14-76
	Валери-Сиб	(3812) 56-64-90, 56-45-20
	Премиум-Дент	(3812) 25-78-01
Орёл	ИП Новиков В.М.	(4862) 45-84-07, 45-84-96
Оренбург	Интеко-Мед	(3532) 53-78-37, 908-903
	Орендент	(3532) 35-86-99, 385-451
	Инком-Мед	(3532) 38-86-91, 38-86-92
Пенза	Рокада Мед	(8412) 98-90-30
	Альба-Дент	(8412) 563-338, 52-57-10
	Альфавита М	(8412) 30-33-22
	Смайл	(8412) 68-55-31, 68-56-09
Пермь	ИнДент	(342) 210-93-33, 212-33-05
Петрозаводск	Кармед	(8142) 76-16-44, 76-51-56
Пятигорск	МедТоргКМВ	8-928-244-44-20
	К-Дент	(8793) 973-188
	Авангард-Мед	(8793) 32-54-20
	Дент-Ал	(8793) 33-92-72, 33-92-75
Ростов-на-Дону	Олимп+	(863) 231-84-01, 231-84-02
	Статус Дон	(863) 245-30-59
	ВК Дент	(863) 299-00-19
	Южные медицинские системы	(863) 247-13-19
	ИП Ефремов Д.А.	(863) 293-06-66, 218-28-97
	Гармония	8-928-988-01-01
	СК Дента	(863) 227-51-43, 227-51-47
	Все для стоматолога	(863) 283-18-93
Рыбинск	Диана-мед	(4855) 29-90-62
Рязань	Колбико	8-953-745-82-12
	Прагма Дент	(4912) 22-78-28
	Инна Люкс	(4912) 27-31-31, 92-75-75
Самара	Инверсия	(846) 270-43-16, 270-43-16
	Рокада Мед	(846) 979-24-00, 979-24-12
	СтомаЛюкс / Биостом	(846) 240-80-10, 240-80-25
	Юнидент-Поволжье	(846) 97-98-600, 97-98-601
Санкт-Петербург	Галактика	(812) 954-63-48, 677-26-70
	Олимп	(812) 493-35-43, 388-48-97
	Алеф Групп	(812) 438-33-84, 438-33-85
	Росдент	(812) 640-85-25, 640-65-99
	Северная Каролина	(812) 702-81-12
	Каро	(812) 712-74-06
	Алвик Медэкспресс	(812) 326-29-17
	Медтехника	(812) 233-65-88
	Ультра-Дент	(812) 426-16-39
	Центр Корал	(812) 327-21-77
	Амрита	(812) 273-23-52, 719-88-63
	Июль	(921)914-41-24, (921)914-24-66
Саранск	СтомаДент	(8342) 48-16-46

Партнеры:

Город	Компания	Телефоны
Саратов	Инверсия (филиал)	(8452) 517-726, 500-344
	Айболит-А	(8452) 74-40-23, 20-21-08
	Форстом	(8452) 52-50-20, 52-03-02
	ДуалФит	(8452) 46-21-50, 50-17-19
	Айсберг Д	(8452) 43-17-32, 433-433
	Альянс	(8452) 239-129, 289-941
	Евростом	(8452) 52-25-82
	Инсайд	(8452) 53-44-51
Севастополь	Стомассорти	(989) 282-73-30
Северодвинск	Полифарм-Мед	(8184) 551-639
Симферополь	Медрегион Крым	8-978-800-63-24, 8-989-824-94-68
	Ковчег-СЛ	8-978-831-43-90, 8-978-766-44-65
	Предприятие Техно Дент	(3652) 51-26-91, 522-996
Смоленск	Стандарт плюс	(4812) 64-43-28, 64-38-74
	Стоматорг плюс	(4812) 64-71-10, 68-39-25
	Дентал Универсритэт	8-929-081-21-77
Сочи	Империя Дент	(862) 227-09-90
	Стомакс	(8622) 90-15-70
Ставропольский край		
Лермонтов	Ставропольмедторг-2000	(879-35) 3-79-63, 3-07-68
Ставрополь	Статус-СТ	(8652) 37-20-84, 37-06-73
	Ставмедкомпания	(8652) 35-26-85, 35-79-28
	Новгодент	(8652) 71-99-77, 35-99-22
	Медицина Дент	(8652) 73-57-67
Старый Оскол	Альфамед	(4725) 39-05-01
Стерлитамак	Анжелика	(3473) 23-92-05
Сургут	Стомакс	(3462) 22-30-02, 22-30-20
Сызрань	Инверсия	(8464) 98-60-57
Сыктывкар	ИП Шарова В.В.	(8212) 21-40-99, 8904-271-76-63
	Мединвест	(8212) 24-83-83, 20-23-69
Тамбов	Медика-Сервис	(4752) 76-06-12
	Надежда-Фарм	(4752) 52-63-16, 52-34-89
	Медсейл	8-960-672-99-99, 8-920-235-5777
Тверь	Эркастом-Т	(4822) 422-811, 429-233
	ТверьСтомТорг	8-980-629-7929, 31-08-81
	Д-тайм	(4822) 39-44-30
	Эдельвейс	(4822) 58-87-44
Тольятти	Рокада Мед	(8482) 735-894, 735-895
	Инверсия	(8482) 34-89-19, 31-43-93
	СтомаЛюкс	(8482) 50-75-08, 55-17-22
Томск	Элион+	(3822) 516-318, 51-26-31
Тула	Денталь	(4872) 58-58-15, 58-58-16
	Дентал Трейдинг	(4872) 58-55-34
	МедФармРазвитие	(4872) 46-35-35
Тюмень	Дарлин	(3452) 73-73-00, 266-920
	Мегадента	(3452) 22-93-06, 22-93-07
	Тюмень-Рокс	(3452) 34-23-87, 34-23-83
	Дентоград	(3452) 69-56-87
Улан-Удэ	МедМаркет 03	(3012) 41-66-50, 417-744
	Митра	(3012) 297-700
	ИП Барский Игорь Михайлович	(3012) 680-812
Ульяновск	Рокада Мед	(8422) 44-03-64, 44-03-81
	Медторг	(8422) 79-42-14
	Инновационные технологии	(8422) 58-97-25
	Панацея+	(8422) 43-44-02, 43-44-03
Уссурийск	Дентал-Экспресс	(4234) 31-90-70, 31-51-40
	Медика	(4234) 32-98-23
Уфа	Рокада Мед	(347) 216-37-34
	Анжелика	(347) 233-75-75, 233-05-81
Хабаровск	Интех Город 27	(4212) 702-277, 8-914-315-73-78
	АМК	(4212) 45-65-15, 45-65-16
	Стома-Трейд	(4212) 21-28-54, 31-57-52
	Стоматологический мир	(4212) 46-45-00
	АМП-Трейд	(4212) 46-96-60
	Дентал-Экспресс	(4212) 59-33-11
	Медтехника, ТД	(4212) 22-15-52

Партнеры:

Город	Компания	Телефоны
Хасавюрт	Дента Сервис	8-988-214-80-39
	Дантист	8-928-969-79-65
Чебоксары	Рокада Мед	(8352) 22-61-10
	Арго	(8352) 55-44-88
	МеДфоДент	(8352) 22-60-23, 22-60-24
Челябинск	Медипарт-Челябинск	(351) 232-62-33, 260-86-65
	ДентаМед	(351) 282-32-47
	Денталика	(351) 261-08-47, 729-99-59
	Здоровье, красота, знания	(351) 727-76-08, 8-902-890-9509
Череповец	Евродентал	(8202) 233-268, 243-093
	ТД ТАТ	(8202) 57-38-78
Черкесск	Фарм-Ю	(87877) 2-23-26
Чита	Ривадент	(3022) 20-11-63, 20-10-40
	Орион	(3022) 31-88-88, 31-62-41
Южно-Сахалинск	Сахмедсервис	(4242) 43-40-98
	Инфамед	(4242) 22-16-32
Якутск	ИП Чернышев О.А.	(4112) 35-10-99
Ярославль	Медтехника плюс	(4852) 73-06-85

Мы делаем работу практикующих стоматологов успешнее, проще и безопаснее, чтобы пациенты были здоровыми, счастливыми и благодарными

С уважением, команда ТехноДент

TehnoDent

Новые материалы рождаются в течение всего года
Оставайтесь в курсе наших новинок

Заходите	www.tehnodent.org
Пишите	zakaz@tehnodent.org
Звоните	+7 (4722) 20-28-94 +7 (4722) 20-28-95 +7 (4722) 20-28-59



Наши дилеры:

*Цены носят рекомендательный характер. Не являются публичной офертой.